

PEELINGI – PRZYGOTOWANIE, ZALECENIA POZABIEGOWE, WSKAZANIA, PRZECIWSKAZANIA, OBJAWY NIEPOŻĄDANE.

PEELING ACNELAN

Przygotowanie:

Przed zabiegiem przeprowadzana jest konsultacja lekarska, podczas której lekarz wykonuje badanie skóry pacjenta, przeprowadza wywiad, a następnie omawia szczegółowo zasadę działania preparatu i przebieg zabiegu oraz jego oczekiwane efekty.

- w okresie 3 tygodni przed zabiegiem nie wykonywać żadnych zabiegów złuszczących (dermabrazja, mikrodermabrazja, złuszczenia chemiczne, kawitacja ultradźwiękowa),
- w okresie 5 dni przed zabiegiem pacjent nie może stosować żadnych substancji aktywnych o działaniu drażniącym; nie należy poddawać się zabiegom depilacji, koloryzacji włosów, trwałej ondulacji itp.; mężczyźni nie powinni golić się w dniu zabiegu,
- nie należy korzystać z solarium i ekspozować skóry na działanie promieniowania słonecznego,
- przed zabiegiem należy zgłosić lekarzowi przyjmowane leki.

Zalecenia pozabiegowe:

Bardzo ważne jest stosowanie w pielęgnacji domowej kremu Acne One (otrzymany przy pierwszym zabiegu), który zawiera główny składnik aktywny, podtrzymujący leczenie. Krem należy stosować wieczorem. W ciągu dnia można dodatkowo stosować krem pozabiegowy (Cicalfate emulsja pozabiegowa), ponieważ przyspiesza on proces złuszczenia. Należy również przed wyjściem z domu nakładać krem z wysokim filtrem przeciwsłonecznym (SPF +50) przez okres 4 tygodni po zabiegu. Poza tym bardzo ważne jest przestrzeganie dodatkowych indywidualnych zaleceń.

- przez 48 godzin po zabiegu należy unikać ekspozycji na światło słoneczne i ciepło, nie wolno również korzystać z solarium, basenu oraz sauny,
- przez 15 dni po sesji Acnelan należy zrezygnować z zabiegów depilacji,
- zabiegi z użyciem wypełniaczy oraz tatuaż można wykonać najwcześniej po tygodniu od zakończenia terapii,
- stosowanie kuracji trądziku retinoidami uzależnione jest od przebiegu terapii oraz wrażliwości skóry pacjenta (o ich wdrożeniu decyduje lekarz),
- pacjenci z nawracającą opryszczką powinni profilaktycznie przyjmować Heviran według zaleceń lekarza,
- w przypadku pojawienia się jakichkolwiek powikłań lub wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,
- wizyta kontrolna w terminie ustalonym z lekarzem w celu oceny efektów leczenia.

Wskazania:

- leczenie wszystkich odmian trądziku (pospolity, młodzieńczy, ropowiczy, skupiony, bliznowaty, polekowy, kosmetyczny i in.),
- zmniejszanie blizn potrądzikowych,
- oczyszczanie skóry tłustej i łojotokowej,
- usuwanie przerostych gruczołów łojowych,
- wyrównywanie koloru skóry (np. usuwania przebarwień i zmian postonecznych).

Przeciwwskazania:

- ciąża i okres karmienia piersią,
- czynna opryszczka (u osób mających nawracające opryszczki konieczne jest zastosowanie Heviranu przed, w trakcie i po zabiegu),
- podrażnienia i uszkodzenia skóry,
- nietolerancja salicylanów,
- terapia retinoidami (doustna i zewnętrzna),
- alergia, uczulenie na preparaty używane w trakcie zabiegu,
- skłonność do powstawania bliznowców,
- pacjenci o niestabilnym profilu psychicznym,
- ciężkie postaci trądziku.

Przed peelingiem należy unikać silnie działających preparatów złuszczących lub drażniących, niewskazana jest depilacja (szczególnie woskiem).

Objawy niepożądane:

- nadmierna reakcja zapalna skóry,
- powstanie blizn u osób ze skłonnością do nadmiernego bliznowacenia,
- istnieje również niewielkie ryzyko infekcji wtórnej - w przypadku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.

PEELING DERMAMELAN

Przygotowanie:

Przed zabiegiem przeprowadzana jest konsultacja lekarska, podczas której lekarz wykonuje badanie skóry pacjenta, przeprowadza wywiad, a następnie omawia szczegółowo zasadę działania preparatu i przebieg zabiegu oraz jego oczekiwane efekty.

- na tydzień przed peelingiem nie należy stosować depilacji, elektrolizy, woskowania, ścierających gąbek, dermabrazji i preparatów drażniących skórę, mężczyźni nie powinni się golić w dniu zabiegu,
- przed zabiegiem należy zgłosić lekarzowi przyjmowane leki,
- w przypadku doustnej izotretynoiny (np. Acnenormin, Roacutan, Izotek, Curacne), zabieg może zostać wykonany po minimum 3 miesiącach od zakończenia terapii

Zalecenia pozabiegowe:

Bardzo istotne jest kontynuowanie terapii w warunkach domowych. Kuracja musi być prowadzona przez co najmniej 3 miesiące, gdyż jej skrócenie może spowodować powrót do stanu wyjściowego i konieczne będzie powtórzenie kuracji. Jeśli leczenie preparatem Cosmelan/Dermamelan zostanie przerwane, przebarwienia mogą pojawić się ponownie, ponieważ terapia nie eliminuje tendencji do hiperpigmentacji, a jedynie ją przerywa. W czasie trwania kuracji nie można jednocześnie używać żadnych innych środków wybielających i złuszczących. Należy stosować krem z wysokim filtrem słonecznym (SPF +50) codziennie rano i przed wyjściem z domu. Zalecane są wizyty kontrolne w terminach ustalonych przez lekarza.

Wskazania:

- usuwanie przebarwień postłonecznych i hormonalnych,
- usuwanie piegów,
- usuwanie plam starczych, rogowacenia postłonecznego,
- wyrównanie kolorytu skóry,
- likwidacja powierzchownych zmarszczek,
- likwidacja rozszerzonych porów skóry

Przeciwwskazania:

- ciąża i okres karmienia piersią,
- miejscowe infekcje skórne,
- czynna opryszczka (u osób mających nawracające opryszczki konieczne jest zastosowanie Heviranu przed, w trakcie i po zabiegu),
- leczenie pochodnymi witaminy A (do 6 miesięcy od zakończenia leczenia),
- podrażnienia i uszkodzenia skóry,
- alergia, uczulenie na preparaty używane w trakcie zabiegu,
- skłonność do powstawania bliznowców,
- aktywny trądzik

Objawy niepożądane:

- nadmierna reakcja zapalna skóry,
- powstanie blizn u osób ze skłonnością do nadmiernego bliznowacenia,
- przebarwienia pozabiegowe u osób nieprzestrzegających ochrony przeciwsłonecznej,
- istnieje również niewielkie ryzyko infekcji wtórnej - w przypadku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych

Inne działania niepożądane są zwykle przewidywalne, umiarkowane i przemijające. Najczęściej to złuszczenie skóry przez około 7-10 dni, zaczerwienienie, tkliwość, nasilenie zmian trądzikowych.

PEELING PIROGRONOWY 50%ENERPEEL Pa

Przygotowanie:

- przed zabiegiem przeprowadzana jest konsultacja lekarska, podczas której lekarz wykonuje badanie skóry pacjenta, przeprowadza wywiad, a następnie omawia szczegółowo zasadę działania preparatu i przebieg zabiegu oraz jego oczekiwane efekty.
- przed przystąpieniem do zabiegu należy kondycjonować skórę przez okres 1-2 tygodni odpowiednim preparatem zaleconym przez lekarza.
- na tydzień przed peelingiem nie należy stosować depilacji, elektrolizy, woskowania, ścierających gąbek, dermabrazji i preparatów drażniących skórę, mężczyźni nie powinni się golić w dniu zabiegu.
- przed zabiegiem należy zgłosić lekarzowi przyjmowane leki,
- w przypadku doustnej izotretynoiny (np. Acnenormin, Roacutan, Izotek, Curacne), zabieg może zostać wykonany po minimum 3 miesiącach od zakończenia terapii,

Zalecenia pozabiegowe:

Bardzo ważne jest stosowanie kremu pozabiegowego (Cicalfate emulsja pozabiegowa), ponieważ przyspiesza on proces złuszczenia. Należy również przed wyjściem z domu nakładać krem z wysokim filtrem przeciwsłonecznym (SPF +50) przez okres 4 tygodni po zabiegu. Poza tym bardzo ważne jest przestrzeganie dodatkowych indywidualnych zaleceń.

Wskazania:

- leczenie trądziku pospolitego,
- zmniejszanie blizn potrądzikowych,
- oczyszczanie skóry tłustej i łojotokowej,
- usuwanie przerostych gruczołów łojowych,
- wyrównywanie koloru skóry (np. usuwania przebarwień i zmian postłonecznych),
- przeciwdziałanie starzeniu się skóry,

- wygładzanie skóry

Przeciwwskazania:

- ciąża i okres karmienia piersią,
- miejscowe infekcje skórne,
- czynna opryszczka (u osób mających nawracające opryszczki konieczne jest zastosowanie Heviranu przed, w trakcie i po zabiegu),
- podrażnienia i uszkodzenia skóry,
- alergia, uczulenie na preparaty używane w trakcie zabiegu,
- skłonność do powstawania bliznowców,
- ciężkie postaci trądziku

Przed peelingiem należy unikać silnie działających preparatów złuszczących lub drażniących, niewskazana jest depilacja (szczególnie woskiem).

Objawy niepożądane:

- nadmierna reakcja zapalna skóry,
- powstanie blizn u osób ze skłonnością do nadmiernego bliznowacenia,
- istnieje również niewielkie ryzyko infekcji wtórnej - w przypadku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych

PEELING PQ AGE

Przygotowanie:

Przed zabiegiem przeprowadzana jest konsultacja lekarska, podczas której lekarz wykonuje badanie skóry pacjenta, przeprowadza wywiad, a następnie omawia szczegółowo zasadę działania preparatu i przebieg zabiegu oraz jego oczekiwane efekty.

- na tydzień przed peelingiem nie należy stosować depilacji, elektrolizy, woskowania, ścierających gąbek, dermabrazji i preparatów drażniących skórę, mężczyźni nie powinni się golić w dniu zabiegu,
- przed zabiegiem należy zgłosić lekarzowi przyjmowane leki,
- w przypadku doustnej izotretynoiny (np. Acnenormin, Roacutan, Izotek, Curacne), zabieg może zostać wykonany po minimum 3 miesiącach od zakończenia terapii.

Zalecenia pozabiegowe:

Bardzo ważne jest stosowanie kremu pozabiegowego (Cicalfate emulsja pozabiegowa), ponieważ przyspiesza on proces gojenia. Należy również przed wyjściem z domu nakładać krem z wysokim filtrem przeciwsłonecznym (SPF +50) przez okres 4 tygodni po zabiegu. Poza tym bardzo ważne jest przestrzeganie dodatkowych indywidualnych zaleceń.

Wskazania:

- utrata napięcia oraz jędrności skóry twarzy i ciała,
- przeciwdziałanie starzeniu się skóry,
- wygładzanie skóry,
- redukcja zaskórników,
- redukcja cellulitu,
- redukcja zmarszczek,
- redukcja blizn (np. blizny potrądzikowe lub pourazowe),
- skóra trądzikowa,
- wyrównywanie koloru skóry (np. usuwania przebarwień i zmian postłonecznych),
- leczenie skóry wrażliwej i delikatnej

Przeciwwskazania:

- ciąża i okres karmienia piersią,
- miejscowe infekcje skórne,
- czynna opryszczka (u osób mających nawracające opryszczki konieczne jest zastosowanie Heviranu przed, w trakcie i po zabiegu),
- podrażnienia i uszkodzenia skóry,
- alergia, uczulenie na preparaty używane w trakcie zabiegu

Objawy niepożądane:

- bardzo rzadko nadmierna reakcja zapalna skóry (mrowienie, pieczenie),
- istnieje również niewielkie ryzyko infekcji wtórnej - w przypadku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych

PEELING RETIX C YELLOWE PEEL

Przygotowanie:

Przed każdym zabiegiem lekarz wykonuje badanie skóry pacjenta, a następnie omawia z pacjentem sposób przeprowadzenia zabiegu i jego oczekiwane efekty. Na tydzień przed peelingiem nie należy stosować depilacji, elektrolizy, woskowania, ścierających gąbek, dermabrazji i preparatów drażniących skórę, mężczyźni nie powinni się golić w dniu zabiegu.

Zalecenia pozabiegowe:

Bardzo ważne jest stosowanie kremu pozabiegowego (Cicalfate emulsja pozabiegowa), ponieważ przyspiesza on proces gojenia. Należy również przed wyjściem z domu nakładać krem z wysokim

filtrem przeciwsłonecznym (SPF +50) przez okres 4 tygodni po zabiegu. Poza tym bardzo ważne jest przestrzeganie dodatkowych indywidualnych zaleceń.

Wskazania:

- odświeżenie, rozjaśnienie, wygładzenie i dotlenienie skóry,
- redukcja drobnych zmarszczek,
- odmładzanie i stymulacja procesów regeneracji skóry,
- wyrównywanie koloru skóry (np. usuwania przebarwień i zmian postłonecznych),
- zmniejszenie wiotkości (atonii) skóry,
- przeciwdziałanie starzeniu się skóry,
- wygładzanie skóry.

Przeciwwskazania:

- ciąża i okres karmienia piersią,
- miejscowe infekcje skórne,
- czynna opryszczka (u osób mających nawracające opryszczki konieczne jest zastosowanie Heviranu przed, w trakcie i po zabiegu),
- leczenie pochodnymi witaminy A (do 6 miesięcy od zakończenia leczenia),
- alergia, uczulenie na preparaty używane w trakcie zabiegu,
- aktywny trądzik
- Przed peelingiem należy unikać silnie działających preparatów złuszczących lub drażniących, niewskazana jest depilacja (szczególnie woskiem).

Objawy niepożądane:

- nadmierna reakcja zapalna skóry u pacjentów alergicznych,
- istnieje również niewielkie ryzyko infekcji wtórnej - w przypadku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych

PEELING TCA

Przygotowanie:

Przed zabiegiem przeprowadzana jest konsultacja lekarska, podczas której lekarz wykonuje badanie skóry pacjenta, przeprowadza wywiad, a następnie omawia szczegółowo zasadę działania preparatu i przebieg zabiegu oraz jego oczekiwane efekty. Na tydzień przed peelingiem nie należy stosować depilacji, elektrolizy, woskowania, ścierających gąbek, dermabrazji, retinoidów i preparatów drażniących skórę, mężczyźni nie powinni się golić w dniu zabiegu.

- przed zabiegiem należy zgłosić lekarzowi przyjmowane leki,

- w przypadku doustnej izotretynoiny (np. Acnenormin, Roacutan, Izotek, Curacne), zabieg może zostać wykonany po minimum 2 miesiącach od zakończenia terapii

Zalecenia pozabiegowe:

Bardzo ważne jest stosowanie kremu pozabiegowego (Cicalfate emulsja pozabiegowa), ponieważ przyspiesza on proces złuszczenia. Należy również przed wyjściem z domu nakładać krem z wysokim filtrem przeciwsłonecznym (SPF +50) przez okres 4 tygodni po zabiegu. Poza tym bardzo ważne jest przestrzeganie dodatkowych indywidualnych zaleceń.

- w przypadku pojawienia się jakichkolwiek powikłań lub wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,
- wizyta kontrolna po upływie 2 tygodni od zabiegu w celu oceny efektów leczenia

Wskazania:

- redukcja blizn potrądzikowych,
- wyrównywania koloru skóry (np. usuwania przebarwień i zmian postłonecznych),
- zmniejszenie wiotkości (atonii) skóry,
- świeże blizny pourazowe,
- redukcja zmarszczek,
- przeciwdziałanie starzeniu się skóry,
- wygładzanie skóry

Przeciwwskazania:

- ciąża i okres karmienia piersią,
- miejscowe infekcje skórne,
- czynna opryszczka (u osób mających nawracające opryszczki konieczne jest zastosowanie Heviranu przed, w trakcie i po zabiegu),
- leczenie pochodnymi witaminy A (do 3 miesięcy od zakończenia leczenia),
- podrażnienia i uszkodzenia skóry,
- alergia, uczulenie na preparaty używane w trakcie zabiegu,
- skłonność do powstawania bliznowców,
- aktywny trądzik

Przed peelingiem należy unikać silnie działających preparatów złuszczących lub drażniących, niewskazana jest depilacja (szczególnie woskiem).

Objawy niepożądane:

- nadmierna reakcja zapalna skóry,
- powstanie blizn u osób ze skłonnością do nadmiernego bliznowacenia,
- istnieje również niewielkie ryzyko infekcji wtórnej - w przypadku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych

Inne działania niepożądane są zwykle przewidywalne, umiarkowane i przemijające. Najczęściej to złuszczenie skóry przez około 7-10 dni, zaczerwienienie, tkliwość, nasilenie zmian trądzikowych.

PEELING PRX-T33

Przygotowanie:

- Przed zabiegiem przeprowadzana jest konsultacja lekarska, podczas której lekarz wykonuje badanie skóry pacjenta, przeprowadza wywiad, a następnie omawia szczegółowo zasadę działania preparatu i przebieg zabiegu oraz jego oczekiwane efekty.
- na tydzień przed peelingiem nie należy stosować depilacji, elektrolizy, woskowania, ścierających gąbek, dermabrazji i preparatów drażniących skórę, mężczyźni nie powinni się golić w dniu zabiegu.
- przed zabiegiem należy zgłosić lekarzowi przyjmowane leki,
- w przypadku doustnej izotretynoiny (np. Acnenormin, Roacutan, Izotek, Curacne), zabieg może zostać wykonany po minimum 3 miesiącach od zakończenia terapii,
- pacjent nie może mieć czynnej opryszczki, a nawracające opryszczki należy zgłosić lekarzowi,

Zalecenia pozabiegowe:

Bardzo ważne jest stosowanie kremu pozabiegowego (Cicalfate emulsja pozabiegowa), ponieważ przyspiesza on proces gojenia. Należy również przed wyjściem z domu nakładać krem z wysokim filtrem przeciwsłonecznym (SPF +50) przez okres 4 tygodni po zabiegu. Poza tym bardzo ważne jest przestrzeganie dodatkowych indywidualnych zaleceń.

Aby przedłużyć efekt zabiegu można stosować płyn wygładzający do twarzy WIQo. Jest to płyn z kwasem glikolowym, przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry, który dzięki działaniu wygładzającemu pozwala uniknąć zagęszczenia skóry.

Wskazania:

- wiotka, odwodniona skóra twarzy i szyi
- utrata napięcia skóry dekoltu i biustu
- zniszczona skóra dłoni
- szara, zmęczona „skóra palacza”
- redukcja zaskórników
- redukcja cellulitu

- redukcja zmarszczek
- redukcja blizn (np. blizny potrądzikowe lub pourazowe)
- skóra trądzikowa
- wyrównywania koloru skóry (np. usuwania przebarwień i zmian postłonecznych)
- leczenie skóry wrażliwej i delikatnej

Przeciwwskazania:

- ciąża i okres karmienia piersią
- miejscowe infekcje skórne
- czynna opryszczka (u osób mających nawracające opryszczki konieczne jest zastosowanie Heviranu przed, w trakcie i po zabiegu)
- podrażnienia i uszkodzenia skóry,
- alergia, uczulenie na preparaty używane w trakcie zabiegu
- opalona skóra, ciemny fototyp
- tanoreksja
- skłonność do powstawania keloidów
- leczenie izotretinoiną (zabieg może zostać wykonany po minimum 3 miesiącach od zakończenia terapii)

Objawy niepożądane:

- bardzo rzadko nadmierna reakcja zapalna skóry (mrowienie, pieczenie)

PEELING BIOPEEL

Przygotowanie:

Przed zabiegiem przeprowadzana jest konsultacja lekarska, podczas której lekarz wykonuje badanie skóry pacjenta, przeprowadza wywiad, a następnie omawia szczegółowo zasadę działania preparatu i przebieg zabiegu oraz jego oczekiwane efekty. Na tydzień przed peelingiem nie należy stosować depilacji, elektrolizy, woskowania, ścierających gąbek, dermabrazji, retinoidów i preparatów drażniących skórę, mężczyźni nie powinni się golić w dniu zabiegu.

- przed zabiegiem należy zgłosić lekarzowi przyjmowane leki,
- w przypadku doustnej izotretynoiny (np. Acnenormin, Roacutan, Izotek, Curacne), zabieg może zostać wykonany po minimum 2 miesiącach od zakończenia terapii

Zalecenia pozabiegowe:

Bardzo ważne jest stosowanie kremu pozabiegowego (Cicalfate emulsja pozabiegowa), ponieważ przyspiesza on proces gojenia. Należy również przed wyjściem z domu nakładać krem z wysokim filtrem przeciwsłonecznym (SPF +50) przez okres 4 tygodni po zabiegu. Poza tym bardzo ważne jest przestrzeganie dodatkowych indywidualnych zaleceń.

Wskazania:

- Biorewitalizacja całego ciała,
- Trądzik aktywny, zaskórnikowy,
- Blizny
- Rozszerzone pory,
- Skóra łojotokowa,
- Wyrównania kolorytu, rozjaśnienie przebarwień

Przeciwwskazania:

- Alergia na składniki znajdujące się w składzie preparatu.
- Opryszczka,
- Leczenie pochodnymi witaminy A (do 12 miesięcy od zakończenia leczenia),
- Ciąża i laktacja,
- Infekcje bakteryjne w obrębie skóry poddawanej zabiegowi,
- Infekcje wirusowe np. aktywna opryszczka, brodawki płaskie,
- Zabiegi chirurgiczne w obrębie twarzy i szyi,
- Przebyta radioterapia lub chemioterapia

Objawy niepożądane:

- bardzo rzadko nadmierna reakcja zapalna skóry (mrowienie, pieczenie)